

6.ÜNİTE




TYT Orta ve İleri Düzey Biyoloji Soru Bankası

Kalıtım ve Biyoçeşitlilik



SEZGİN EROL



KALITIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Varyasyon

Mutasyon

Akraba Evliliği

Ayrılmama

Mitokondriyal Kalıtım



VARYASYON

- Bir türe ait bireyler arasındaki genetik farklılığa denir.
- Varyasyona;
- Homolog kromozomların rastgele ayrılması
- Crossing over
- Döllenme
- Mutasyon olayları neden olmaktadır.

MUTASYON

- Çeşitli faktörlerin etkisi sonucu genlerde meydana gelen değişime denir.
- Mutasyon olayı öldürücü olabilir.
- Otozomlarda ve gonozomlarda meydana gelen ayrılmama olayları çeşitli genetik rahatsızlıkların oluşmasına neden olur.
- Down sendromu otozomlarda ayrılmama durumuna,
- Turner sendromu, Klinefelter erkek ve süper dişi sendromları da gonozomlarda ayrılmama olaylarına örnektir.

- Kromozomların yapısında meydana gelen deęişimlerde varyasyona neden olur.
- Delesyon gibi



AKRABA EVLİLİĞİ

- Kalıtsal yapıları birbirine yakın bireylerin evlenmesi zararlı genlerin bir araya gelerek ortaya çıkma olasılığını artırır.
- Bu olasılıkta evlilikler sonucunda doğan çocuklarda genetik hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir.



AYRILMAMA

→ Otozomlarda Ayrilmama

(♀) 44 + XX

44 + XY (♂)

Otozomlarda
ayrilmama

1. 23 + X

2. 21 + X

3. 22 + X

4. 22 + Y

→ Gonozomlarda Ayrilmama

(♀) 44 + XX

Gonozomlarda
ayrilmama

1. 22 + XX

2. 22 + O

44 + XY

3. 22 + X

4. 22 + Y

MİTOKONDRIYAL KALITIM

→ Mitokondri aktarımı sadece anneden çocuklarına doğru olmaktadır.



Örnek:

Bir deneyde şekildeki gibi sırtına buz yastığı bağlanıp bir hafta kadar tutulan bir himalaya tavşanının sırt bölgesinde siyah kılların çıktığı görülmüştür.



Buna göre, bu tavşanla ilgili olarak;

- I. Fenotipik özelliklerin ortaya çıkması çevre ve genin birlikte etkileşimi ile olur.
- II. Bazı fenotipik varyasyonlar gerekli şartlar sağlandığında kendini gösterebilir.
- III. Genotipik varyasyonlar çevre şartlarından etkilenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I


B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Örnek:



1. Şekil



2. Şekil

Yukarıdaki 2. Şekilde, toprak bembeyaz karla örtülü olduğunda kutup kuşlarının tüylerinin de bembeyaz tüylerle kaplı olduğu baharda ise toprakta yeşil ot ve çiçeklerin çıkmasına bağlı olarak (1. Şekil) kutup kuşlarının tüylerinin renklerinde de olağanüstü bir değişim yaşandığı ve deri üzerinde yeşil renkli tüyler çıkmaya başladığı görüldüğüne göre, kutup kuşlarında görülen bu değişim ile ilgili olarak;

- I. Canlıda farklı şartlarda farklı genler aktivite gösterebilir.
- II. Bir canlıda görülen fenotip farklılıklar çevre şartları etkisiyle ortaya çıkar.
- III. Bazı fenotip farklılıklar canlıda sinir uyarısıyla oluşan kalıtsal özelliklerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III