


3.ÜNİTE



TYT Temel ve Orta Düzey Biyoloji Soru Bankası

Canlıların Sınıflandırılması



SEZGİN EROL

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI


Yapay Sınıflandırma

Doğal Sınıflandırma

Tür

İkili Adlandırma

→ Taksonomi (sistemik) canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırarak inceleyen bilim dalıdır.




Yapay (ampirik) sınıflandırma

- Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırma-dır.
- Aristo'nun doku ve organların görevlerini (analojilerini) dikkate alarak yaptığı sınıflandırmadır.
- Yapay sınıflandırmanın dayandığı temel analog (görevdeş) organlar ve şekil benzerliğidir.

ANALOG ORGAN

→ Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır.



Dođal (filogenetik) Sınıflandırma

- İlk dođal sınıflandırmayı yapan bilim insanı John Ray dir.
- Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu ise Carolus Linnaeus dur.
- Günümüzde dođal sınıflandırmada ;
 - Protein benzerliđi
 - Köken (orjin) benzerliđi
 - Vücut simetrileri
 - Embriyonik gelişimleri
 - Hücre yapısı ve sayısı
 - Boşaltım atıđı çeşitleri
 - Beslenme ve üreme şekli
 - Akrabalık dereceleri
 - Anatomik ve fizyolojik yapı
 - Homolog organ benzerliđi dikkate alınan kriterlerdir.

HOMOLOG ORGAN




→ Kökenleri (orjin) aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır.

İnsan

Kedi

Balina

Yarasa



Kol

Ön ayak

Yüzgeç

Kanat



TÜR

- Bu kavramı ilk ortaya atan bilim insanı John Ray'dır.
- Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular (verimli dölleri) verebilen bireyler topluluğuna tür denir.
- Aynı türdeki bireylerin tümünün kromozom sayıları aynıdır. (YANLIŞ)
- Aynı türe ait sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynıdır. (DOĞRU)
- Farklı türlere ait canlıların kromozom sayıları da aynı olabilir.



İKİLİ (BINOMİNAL) ADLANDIRMA

→ 17. yüzyılda John Ray bitkileri araştırmış, sınıflandırmış ve yazdığı kitabında tür kavramını kullanmıştır. Daha sonra İsveçli botanikçi Carl Linnaeus doğal sınıflandırma biliminin kurucusu olmuştur. Linnaeus, tür gruplarını kullanarak canlıların isimlendirilmesinde canlılar arasındaki yakınlık derecesini gösterecek iki kelimedenden oluşan isimlendirme yöntemi olan ikili adlandırma (Binominal Adlandırma) sistemini kurmuştur.

Tür adı = cins adı + tamamlayıcı ad

Felis domesticus = *Felis* + *domesticus*


Örnek:

- *Morus nigra*
- *Pinus nigra*
- *Felis leo*
- *Felis tigris*
- *Felis domesticus*




SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORİLER

→ Doğal sınıflandırmada canlılar, tür ile başlayan ve âlem ile sonlanan 7 farklı kategoride gruplandırılır.





Alemden türe doğru
gidildikçe;

- Protein benzerliği artar.
- Gen benzerliği artar.
- Canlı çeşitliliği azalır.
- Farklı gen sayısı azalır.
- Birey sayısı azalır.
- Ortak özellikler artar.
- Embriyonik gelişim benzerliği artar.
- Homolog organlar artar.



Türden aleme doğru
gidildikçe;

- Protein benzerliği azalır.
- Gen benzerliği azalır.
- Canlı çeşitliliği artar.
- Farklı gen sayısı artar.
- Birey sayısı artar.
- Ortak özellikler azalır.
- Embriyonik gelişim benzerliği azalır.
- Homolog organlar azalır.



Kategori	Takson	Takson
Âlem	Hayvanlar âlemi	Bitkiler âlemi
Şube	Omurgalılar	Kapalı tohumlar
Sınıf	Memeliler	Çift çenekliler
Takım	Etçiller	Güller
Aile	Kedigiller	Gülgiller
Cins	Kedi	Gül
Tür	Evcil kedi	Kuşburnu

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisinde, embriyo gelişiminde aktivite gösteren sistematik birimlere ait genler, zigottan itibaren aktivite gösterme sırasına göre verilmiştir?

- A) Tür → Cins → Aile → Takım
- B) Aile → Takım → Sınıf → Şube
- C) Şube → Sınıf → Takım → Aile
- D) Takım → Aile → Cins → Tür
- E) Cins → Aile → Takım → Sınıf

YAYINLARI

Örnek:

- Rana dalmatina
- Rana ridibunda
- Canis lupus
- Felis tigris
- Felis leo
- Populus alba
- Populus nigra

Yukarıda verilen bireylerin her biri, bir ormanda çok sayıda bulunduğuna göre, bu orman ile ilgili olarak;

- I. 4 çeşit cins vardır.
- II. 7 çeşit popülasyon vardır.
- III. 4 çeşit alem vardır.

ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

